

# Sustain III<sup>®</sup>

**Sulfametazina en Bolos**

Reg. SAGARPA Q-0513-065

## INDICACIONES

SUSTAIN III<sup>®</sup> Bolos está indicado para el tratamiento de las siguientes enfermedades cuando es causada por uno o más de los siguientes organismos patógenos sensibles a la sulfametazina: neumonía bacteriana y bovina, Complejo Respiratorio Bovino (fiebre de embarque) (*Pasteurella* spp.), Colibacilosis (diarreas bacterianas) (*E. coli*), pododermatitis necrótica (podredumbre del pie), difteria de becerro (*Fusobacterium necrophorum*), Metritis aguda (*Streptococcus* spp.).

## BENEFICIOS

- Menos manipulación: 72 horas de sostenida actividad antibacteriana
- Efectivo: Actividad de amplio espectro contra una gran variedad de enfermedades de ganado.
- Ideal para programas al recibo de ganado: ayuda a vencer infecciones tempranas
- Acción rápida: Logra niveles sanguíneos altos en seis horas
- Aprobado por la FDA y SAGARPA



## PRESENTACIONES

LIST NO.	PRESENTACIÓN	CANT. x CAJA
1SUS036	10 Bolos	12
1SUS004	50 Bolos	4
1SUS023	100 Bolos	6

Ver el reverso para completa información de administración y dosis.

**Bimeda de México S.A. de C.V.**

Calle Acceso IV #35 Int. "J"

Zona Industrial Benito Juárez I Querétaro, Qro.

Tel: (+) 52-442-223-5933 Fax: 248-3332

[www.bimeda.mx](http://www.bimeda.mx)

## Sustain III®

### Sulfametazina en Bolos

Reg. SAGARPA Q-0513-065

#### INDICACIONES

SUSTAIN III® Bolos está indicado para el tratamiento de las siguientes enfermedades cuando es causada por uno o más de los siguientes organismos patógenos sensibles a la sulfametazina: neumonía bacteriana y bovina, Complejo Respiratorio Bovino (fiebre de embarque) (*Pasteurella* spp.), Colibacilosis (diarreas bacterianas) (*E. coli*), pododermatitis necrótica (podredumbre del pie), difteria de becerro (*Fusobacterium necrophorum*), Metritis aguda (*Streptococcus* spp.).

Cada bolo contiene:

Sulfametazina (formulado en una base de liberación prolongada)..... 32,1 gramos

SUSTAIN III® bolos (sulfametazina bolos de liberación prolongada) esta destinado a la administración oral para el ganado bovino de carne y leche, y ganado no lactante. (VER ADVERTENCIAS)

#### ATENCIÓN:

Este medicamento, al igual que todas las sulfonamidas, puede causar reacciones tóxicas y lesiones irreparables a menos que se administre con la supervisión adecuada y continua; siga cuidadosamente las dosis recomendadas.

#### ADVERTENCIA:

Los animales destinados al consumo humano no deben ser sacrificados durante al menos 12 días después de la última dosis. Dos (2) dosis consecutivas pueden causar daño de tejidos al permanecer más allá de el tiempo de espera. No usar en ganado lechero de 20 meses de edad o más. El uso de Sulfametazina en esta clase de ganado puede causar residuos en la leche. No utilizar en terneros de menos de un (1) mes de edad o terneros alimentados con una dieta de leche solamente.

#### DOSIS Y ADMINISTRACION:

III SUSTAIN® bolos (Sulfametazina bolos de liberación prolongada) está diseñado para ser administrado por vía oral para bovino de carne y bovino de leche, así como para becerros destetados (Ver advertencias).

SUSTAIN III® bolos se debe administrar de acuerdo a la pauta de dosificación siguiente:

Este bolo se puede dividir para una mejor aproximación de la dosis correcta;

Sin embargo se debe tener cuidado de no aplastar el bolo.

Se debe cuidar que el bolo sea tragado completamente por el animal para garantizar una dosis completa.

Observe los animales después de la administración para garantizar bolos no sean regurgitados. Lubrique SUSTAIN III® antes de la dosificación animales para su fácil ingestión.

SUSTAIN III® bolos están diseñados para proporcionar un nivel terapéutico de Sulfametazina en aproximadamente 6 horas y persisten en este nivel durante 72 horas (3 días). Después de 72 horas, todos los animales deben examinarse para ver que los síntomas se hayan erradicado completamente. Si los síntomas continúan, consulte a su médico veterinario. Se recomienda ampliamente una segunda dosis adicional después de la primer terapia de 72, en particular en los casos más graves. La dosis del esquema anterior se debe utilizar en un intervalo de 72 horas. La ingesta de líquidos debe ser suficiente en todo momento durante la terapia de tres días.

#### PRESENTACIÓN:

SUSTAIN III® Sulfametazina bolos de liberación prolongada, presentaciones en 100 bolos.

Sustain III Cattle es una marca registrada de Bimeda, Inc. © 2005 Bimeda, Inc. Todos los derechos reservados. SMG-TS-0115-3000

No Bolos	Peso Vivo libras	No Bolos	Peso Vivo libras
1	200	3.5	700
1.5	300	4	800
2	400	4.5	900
2.5	500	5	1000
3	600		