BIMECTIN® LA

Ivermectina al 3.15% en solución inyectable

FICHA TÉCNICA



INDICACIONES

Parásitos redondos gastrointestinales: (adulto y larvas cuarto estadío) Ostertagia lyrata, Ostertagia ostertagi (incluyendo larva inhibidas), Cooperia oncophora, Cooperia pectinata, Cooperia punctata, Haemonchus placei, Trichostrongylus axei, Trichostrongylus colubriformis, Bunostomum phlebotomum, Oesophagostomum radiatum, Strongyloides papillosus (adulto), Nematodirus helvetianus (adulto), Nematodirus spathiger (adulto), Trichuris spp (adulto). Parásitos de pulmón: (adulto y larva de cuarto estadío) Dictyocaulus viviparus. Parásitos del ojos: (adulto) Thelazia spp. Moscas: estadíos larvarios de Dermatobia hominis, Hypoderma bovis, Hypoderma lineatum, Cochliomyia hominivorax y moscas chupadoras. Ácaros de sarna: (adulto e inmaduro) Psoroptes bovis, Sarcoptes scabei var. bovis. Piojos: (adulto e inmaduro) Linognathus vituli, Haematopinus eurysternus, Solenopotes capillatus. Como ayuda en el control de ácaros de sarna Chorioptes bovis y Damalinia bovis.

En ovinos: Para tratamiento y control de sarna psoróptica, nematodos gastrointestinales, parásitos de pulmón y nasales de oestrus. Parásitos redondos gastrointestinales: (adulto y larvas cuarto estadío) Ostertagia circumcincta (incluyendo larvas inhibidas), O. trifurcate, Haemonchus contortus (incluyendo larvas inhibidas), Trichostrongylus axei (adulto), T. colubriformis, T. vitrinus (adulto), Cooperia curticei, Oesophagostomum columbianum, O. venulosum (adulto), Nematodirus filicollis, Chabertia ovina, Trichuris ovis (adulto). Parásitos de pulmón: (adulto y larva cuarto estadío) Dictyocaulus filaria, Protostrongylus rufescens (adulto). Fase nasal: (inmaduro) Oestrus ovis. Ácaros: (adulto e inmaduro) Psoroptes ovis. BIMECTIN° LA tiene un vehículo exclusivo y de larga acción, tomando en cuenta el vehículo serán necesarias 2 aplicaciones para el tratamiento de la sarna de ovinos.

BENEFICIOS

- Desparasitante inyectable de amplio espectro para uso en bovinos y porcinos.
- La ivermectina provoca la parálisis y muerte de los parásitos.
- Dosis única.
- Mayor concentración que permite una menor dosificación.



Ver el reverso para información completa de administración y dosis



BIMECTIN® LA

Solución inyectable



DESCRIPCIÓN

BIMECTIN° LA inyectable es una solución estéril, lista para usarse, que contiene 31.5 mg de ivermectina por cada mililitro de excipiente c.b.p. **BIMECTIN° LA** inyectable está formulado para proporcionar la dosis recomendada de ivermectina, con un efecto de larga acción, cuando se aplica por vía subcutánea a razón de 1 ml por cada 50 kg de peso en bovinos.

En el caso de ovinos, **BÍMECTIN**° LA inyectable está formulado para proporcionar la dosis recomendada de ivermectina cuando se aplica en forma subcutánea a razón de 0.5 ml por cada 25 kg de peso.

FÓRMULA

Cada ml contiene:

Ivermectina31.5 mgVehículo c.b.p.1 ml

INDICACIONES

Parásitos redondos gastrointestinales: (adulto y larvas cuarto estadío) Ostertagia lyrata, Ostertagia ostertagi (incluyendo larva inhibidas), Cooperia oncophora, Cooperia pectinata, Cooperia punctata, Haemonchus placei, Trichostrongylus axei, Trichostrongylus colubriformis, Bunostomum phlebotomum, Oesophagostomum radiatum, Strongyloides papillosus (adulto), Nematodirus helvetianus (adulto), Nematodirus spathiger (adulto), Trichuris spp (adulto). Parásitos de pulmón: (adulto y larva de cuarto estadío) Dictyocaulus viviparus. Parásitos del ojos: (adulto) Thelazia spp. Moscas: estadíos larvarios de Dermatobia hominis, Hypoderma bovis, Hypoderma lineatum, Cochliomyia hominivorax y moscas chupadores. Ácaros de sarna: (adulto e inmaduro) Psoroptes bovis, Sarcoptes scabei var. bovis. Piojos: (adulto e inmaduro) Linognathus vituli, Haematopinus eurysternus, Solenopotes capillatus. Como ayuda en el control de ácaros de sarna Chorioptes bovis y Damalinia bovis.

En ovinos: Para tratamiento y control de sarna psoróptica, nematodos gastrointestinales, parásitos de pulmón y nasales de oestrus. Parásitos redondos gastrointestinales: (adulto y larvas cuarto estadío) Ostertagia circumcincta (incluyendo larvas inhibidas), O. trifurcate, Haemonchus contortus (incluyendo larvas inhibidas), Trichostrongylus axei (adulto), T. colubriformis, T. vitrinus (adulto), Cooperia curticei, Oesophagostomum columbianum, O. venulosum (adulto), Nematodirus filicollis, Chabertia ovina, Trichuris ovis (adulto). Parásitos de pulmón: (adulto y larva cuarto estadío) Dictyocaulus filaria, Protostrongylus rufescens (adulto). Fase nasal: (inmaduro) Oestrus ovis. Ácaros: (adulto e inmaduro) Psoroptes ovis. BIMECTIN° LA tiene un vehículo exclusivo y de larga acción, tomando en cuenta el vehículo serán necesarias 2 aplicaciones para el tratamiento de la sarna de ovinos.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Bovinos: 1 ml por cada 50 kg de peso vivo. **Ovinos:** 0.5 ml por cada 25 kg de peso vivo.

En ambas especies por vía subcutánea o intramuscular.

ADVERTENCIAS

Los bovinos y ovinos tratados con **BIMECTIN° LA** inyectable deben ser sacrificados con fines alimentarios por lo menos 120 días después del último tratamiento. No usar para el tratamiento de vacas produciendo leche para consumo humano.

En ganado lechero gestante aplicar por lo menos 2 meses antes del parto o al momento del secado.

Prohibido el uso de este producto para el control de la garrapata *Boophilus* spp.

Almacenar entre los 15 y 30°C, en un lugar seco, fresco y protegido de la luz.

Mantener lejos del alcance de los niños.

De uso veterinario exclusivamente.

PRESENTACIÓN

Envase con 500 ml.

Consulte al Médico Veterinario Zootecnista. Tome su tiempo, lea las indicaciones en la etiqueta.

TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

BIMEDA DE MÉXICO, S.A. de C.V.

Calle Acceso IV #35 Int."J" Zona Industrial Benito Juárez | Querétaro, Qro. Tel:(+) 52-442-223-5933 Fax: 248-3332 01-800-216-9390

www.bimeda.mx

REGISTRO 0-0513-092





Bimectin® LA es una marca registrada de Bimeda, Inc.

