


# TETROXY HCA®

Oxitetraciclina HCl soluble al agua

## FICHA TÉCNICA




### INDICACIONES

Para su uso en el agua potable de las aves de corral y cerdos para el control de enfermedades específicas susceptibles a la oxitetraciclina. (Ver tabla al reverso)

### BENEFICIOS

- **Versátil:** El tratamiento con antibióticos para pollos, pavos y cerdos.
- **Segura:** Cero tiempo de retiro para sacrificio.
- **Cómodo, preciso y económico empaque fácil de usar y almacenar.**
- **Soluble:** se disuelve fácilmente en agua
- **Aprobado por la FDA**



Ver el reverso para información completa de administración y dosis

# TETROXY HCA®



## Oxitetraciclina HCl soluble al agua

### MODO DE EMPLEO

Prepare diariamente la solución (agua medicada). Administre como única fuente de agua potable al animal. No mezclar este producto con leche o sustitutos de leche. Administrar una hora antes o dos horas después de comer leche o sustitutos de leche.

En caso de no observar mejoría pasando de 24 a 48 horas, consulte a un veterinario especialista en aves o a un laboratorio de diagnóstico especializado.

Como generalización 200 pollos deben consumir 3.78 litros de agua por día para cada semana de edad. Los Pavos consumirán dos veces esa cantidad. Administrar en pollos y pavos de 7 a 14 días y para porcinos hasta 5 días.

NOTA: La concentración de fármaco necesaria en el agua medicada es suficiente para compensar la variación en la edad de las aves, los piensos o raciones de consumo, así como la temperatura y la humedad ambiental, los cuales afectan el consumo de agua.

### PRECAUCIONES

Utilizar como única fuente de oxitetraciclina. No debe utilizarse durante más de 14 días consecutivos en los pollos y los pavos o 5 días consecutivos en los cerdos.

### PRESENTACIÓN

Sobre 280 grs.

### ADVERTENCIA

No alimente a las aves productoras de huevos para el consumo humano.  
Interrumpir tratamiento de los pollos, pavos y porcinos 0 días antes del sacrificio.  
Para uso en el agua potable solamente.  
No debe utilizarse en conjunto con alimentos o suplementos líquidos.

Manténgase fuera del alcance de los niños.  
Almacenar el paquete a una temperatura de 25°C.  
Consulte a su Médico Veterinario Zootecnista.  
Tome su tiempo, lea las indicaciones en la etiqueta.  
Protege de la luz.

	Enfermedad	Nivel de tratamiento	Solución en existencia 280 por 3.78 litros-560 por 7.56 litros.
P O L L O S	Control de infecciones Sinovitis causada por <i>Mycoplasma synoviales</i> susceptibles a la oxitetraciclina.	200-400 mg	¼-½ Paquete (70-140 g)
	Control de Enfermedades Respiratorias crónicas e infecciones de los sacos aéreos causados por <i>Mycoplasma gallisepticum</i> y <i>Escherichia coli</i> , susceptibles a la oxitetraciclina.	400-800 mg	½-1 Paquete (140-280g)
	Control de cólera en aves de corral causada por <i>Pasteurella multocida</i> susceptibles a la oxitetraciclina.	400-800 mg	½-1 Paquete (140-280 g)
P A V O S	Control de la Hexamitiasis causada por <i>Escamita meleagridis</i> susceptible a la oxitetraciclina.	200-400 mg	¼- ½ Paquete (70 -140 g)
	Control de al sinovitis causada por <i>Mycoplasma synoviae</i> , susceptible a la oxitetraciclina.	400mg	½ Paquete (140 g)
	Pavos en crecimiento, control y complicaciones de organismos bacterianos asociados a la enfermedad de cresta azul ( <i>enteritis transmisible</i> , <i>enteritis Coronavial</i> ) susceptibles a la oxitetraciclina.	25 mg/453.5 g de peso	Varía con la edad y el consumo de agua.
C E R D O S	Para el control y tratamiento de las siguientes enfermedades en cerdos:  Enteritis bacteriana causada por <i>Escherichia coli</i> y <i>Salmonella choleraesuis</i> , susceptibles a la oxitetraciclina. Neumonía bacteriana causada por <i>Pasteurella multocida</i> susceptibles a la oxitetraciclina. Para cerdas en reproducción: leptospirosis (reduce la incidencia de abortos y contagio de <i>Leptospira</i> ) causado por <i>Leptospira pomona</i> , susceptible a oxitetraciclina.	10 mg/453.5 g de peso	Varía con la edad y el consumo de agua.

### TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

**BIMEDA DE MÉXICO, S.A. de C.V.**

Calle Acceso IV #35 Int. "J", Zona Industrial Benito Juárez | Querétaro, Qro.

Tel:(+) 52-442-223-5933 Fax: 248-3332 01-800-216-9390

www.bimeda.mx

### REGISTRO

Q-0513-021

TOME SU TIEMPO



OBSERVE LAS INSTRUCCIONES  
DE LA ETIQUETA

[www.bimeda.mx](http://www.bimeda.mx)

Tetroxy HCA® es una marca registrada de Bimeda, Inc.